

Maisons-Alfort, le 13 avril 2018

## **Conclusions de l'évaluation**

### **relatives à une demande de renouvellement de l'autorisation de mise à disposition sur le marché pour le produit biocide BRODITOP PATE FRAICHE à base de brodifacoum, de la société ZAPI S.p.A**

*L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides.*

*Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité.*

*Le présent document ne constitue pas une décision.*

## **PRESENTATION DE LA DEMANDE**

### **DESCRIPTION DE LA DEMANDE ET DE LA PREPARATION**

L'Agence a accusé réception d'un dossier de demande de renouvellement de l'autorisation de mise à disposition sur le marché (AMM) pour le produit biocide BRODITOP PATE FRAICHE de la société ZAPI S.p.A. par reconnaissance mutuelle simultanée.

Le produit biocide BRODITOP PATE FRAICHE est un type de produit 14<sup>1</sup> à base de 0,005 % de brodifacoum<sup>2</sup>, destiné à lutte contre les rongeurs. Le produit biocide est un appât sous forme de pâte prête à l'emploi. Il est actuellement autorisé pour des usages à l'intérieur et autour des bâtiments par les professionnels et les non professionnels.

En application du règlement (UE) 2016/1179<sup>3</sup> modifiant la classification de la substance active brodifacoum, le produit biocide BRODITOP PATE FRAICHE est désormais classé en tant que toxique pour la reproduction catégorie 1A. En conséquence, les usages pour les non-professionnels ne peuvent être autorisés.

### **DESCRIPTION DU CADRE REGLEMENTAIRE**

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction d'Évaluation des Produits Réglementés (DEPR) de l'Agence du rapport d'évaluation du produit préparé par le Royaume-Uni, Etat membre de référence (EMR) conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 528/2012<sup>4</sup>.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides, soit au niveau européen, soit par la DEPR. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°528/2012.

<sup>1</sup> TP14 : Rodenticide.

<sup>2</sup> Règlement d'exécution (UE) 2017/1381 de la Commission du 25 juillet 2017 renouvelant l'approbation du brodifacoum en tant que substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 14.

<sup>3</sup> Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

<sup>4</sup> Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

## DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D'EVALUATION

La demande de renouvellement de l'AMM du produit BRODITOP PATE FRAICHE a été évaluée par le Royaume-Uni, Etat membre de référence.

L'évaluation a donné lieu à la rédaction d'un rapport d'évaluation du produit soumis à commentaires auprès des Etats membres concernés avant finalisation et validation par les autorités anglaises

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle simultanée, la DEPR a fait part de ses commentaires sur le rapport d'évaluation et sur le résumé des caractéristiques du produit au nom de l'autorité compétente française conformément aux lignes directrices pour la délivrance des AMM biocides de l'Anses<sup>5</sup>.

Les conclusions de l'évaluation se rapportent au rapport d'évaluation du produit des autorités anglaises et à son analyse par la DEPR et présentent ici une synthèse des éléments scientifiques essentiels qui conduisent aux recommandations émises par la DEPR. Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) issu de l'évaluation de cette demande est présenté en annexe.

Après consultation de l'ensemble des Etats membres concernés par la demande, la DEPR émet les conclusions suivantes.

## SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

### PHYSICO-CHIMIE

Les caractéristiques physico-chimiques du produit BRODITOP PATE FRAICHE ont été décrites et sont considérées comme conformes dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.

### EFFICACITE

Les éléments soumis dans le dossier permettent de conclure que le produit BRODITOP PATE FRAICHE est efficace contre les rats (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*) et la souris domestique (*Mus musculus*), dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

### RESISTANCE

Des données récentes montrent le développement de populations de rongeurs résistantes aux AVK de première génération et l'apparition plus récente de résistances croisées avec les AVK de seconde génération.

Il conviendra de suivre la résistance des populations de rongeurs à la substance active brodifacoum et de fournir les résultats de ce suivi au renouvellement de l'autorisation.

<sup>5</sup> <https://www.anses.fr/fr/system/files/LignesDirectricesBiocides.pdf>

## RISQUE POUR LA SANTE HUMAINE

L'estimation des expositions, liées à l'utilisation du produit BRODITOP PATE FRAICHE pour les usages revendiqués, est inférieure à l'AEL<sup>6</sup> pour les utilisateurs et les autres personnes exposées, dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

## RISQUE VIA L'ALIMENTATION

Considérant les conditions d'emploi du produit BRODITOP PATE FRAICHE, une contamination directe de l'alimentation n'est pas attendue. Par conséquent, une évaluation du risque n'a pas été jugée pertinente. Le risque via l'alimentation est conforme dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

## RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les niveaux d'exposition estimés pour les espèces non-cibles du compartiment terrestre (autres que les oiseaux et les mammifères), liés à l'utilisation du produit BRODITOP PATE FRAICHE dans et autour des bâtiments sont inférieurs à la valeur de toxicité de référence pour chaque compartiment dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

Les concentrations en substance active estimées dans les eaux souterraines, liées à l'utilisation du produit BRODITOP PATE FRAICHE, sont inférieures à la valeur seuil définie par la Directive 98/83/EC dans les conditions d'emploi précisées dans le RCP en annexe.

Les niveaux d'exposition estimés pour les oiseaux et les mammifères sont supérieurs aux valeurs de toxicité de référence. L'évaluation indique un risque élevé pour les espèces non-cibles suite principalement à la prédation de rongeurs contaminés.

Des mesures de gestion des risques ont été incluses dans le règlement renouvelant l'approbation de la substance brodifacoum. Ces mesures visent à réduire le risque d'empoisonnement primaire et secondaire, sans toutefois que la survenue de tels empoisonnements ne puisse être exclue. Ces mesures de gestion de risques sont reprises dans le RCP en annexe.

---

<sup>6</sup> AEL : (Acceptable Exposure Level ou niveau acceptable d'exposition) est la quantité maximale de substance active à laquelle un humain peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé.

## CONCLUSIONS

En résumé, la conformité ou l'absence de conformité aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°528/2012 pour le produit BRODITOP PATE FRAICHE est indiquée dans le tableau suivant, usage par usage et sous réserve, à l'exception des usages non conformes, des conditions d'emploi décrites dans le projet de résumé des caractéristiques du produit présenté en annexe.

### Résultats de l'évaluation pour les usages revendiqués dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit BRODITOP PATE FRAICHE

Organismes cibles	Doses	Conditions d'emploi	Conclusions
Rats ( <i>Rattus rattus</i> et <i>Rattus norvegicus</i> )	Jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacé de 5 à 10 mètres	Professionnels Application à l'intérieur et autour des bâtiments	<b>Conforme</b> Avec application des mesures de gestion des risques prévues par le règlement d'approbation de la substance active, le risque d'empoisonnement primaire et secondaire des espèces non-cibles ne peut être exclu
Souris ( <i>Mus musculus</i> )	Jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacé de 2 à 5 mètres	Professionnels Application à l'intérieur et autour des bâtiments	

## ANNEXE

# Proposition de Résumé des caractéristiques du produit biocide issu des conclusions de l'évaluation

## 1. Informations administratives

### 1.1. Nom commercial du produit

Nom commercial	BRODITOP PATE FRAICHE

### 1.2. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché

Nom et adresse du détenteur	Nom	Zapi S.p.A
	Adresse	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve (PD) Italie
Numéro de demande	BC-VL030388-21	
Type de demande	Renouvellement par reconnaissance mutuelle simultanée	

### 1.3. Fabricant(s) du produit biocide

Nom du fabricant	Zapi S.p.A
Adresse du fabricant	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italie
Emplacement des sites de fabrication	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italie

### 1.4. Fabricant(s) de la (des) substance(s) active(s)

Substance active	Brodifacoum
Nom du fabricant	PM Tezza s.r.l.
Adresse du fabricant	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Italie
Emplacement des sites de fabrication	Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italie

## 2. Composition du produit et type de formulation

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)
Brodifacoum (pure)	3-[3-(4'-bromobiphényl- 4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro -1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine	Substance active	56073-10-0	259-980-5	0,005

### 2.2. Type de formulation

RB – Appât prêt à l'emploi sous forme de pâte
---

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

### 3.1. Classification et étiquetage du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008

<b>Classification</b>	
Catégories de danger	Toxique pour la reproduction catégorie 1A Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 2
Mentions de danger	H360D : Peut nuire au fœtus H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
<b>Etiquetage</b>	
Mentions d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H360D: Peut nuire au fœtus H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
Conseils de prudence	P201: Se procurer les instructions avant utilisation. P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P308 + P313 : En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P314: Consulter un médecin en cas de malaise. P405 : Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans ...
Note	-

## 4. Usage(s) autorisé(s)

### 4.1. Description de l'usage

Tableau 1. Usage # 1 – Souris et /ou rats – Professionnels – Intérieur

Type de produit	14
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	<i>Mus musculus</i> (souris domestique) <i>Rattus norvegicus</i> (rat brun) <i>Rattus rattus</i> (rat noir)
Domaine(s) d'utilisation	Intérieur
Méthode(s) d'application	Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des: <ul style="list-style-type: none"> <li>- postes d'appâtage sécurisés ;</li> <li>- points d'appâtage couverts et protégés.</li> </ul>
Dose(s) et fréquence(s) d'application	Appât: Rats <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte infestation : Jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres</li> <li>- Faible infestation : Jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres</li> </ul> Souris : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte infestation : Jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres</li> <li>- Faible infestation : Jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres</li> </ul>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	Conditionnement maximum 5 kg Le produit BRODITOP PATE FRAICHE est emballé dans des <ul style="list-style-type: none"> <li>- sachets en papier thermoscellés (10-15 g) ;</li> <li>- barquettes en PET (de 50 g pour les souris et de 100 g pour les rats) ;</li> <li>- tubes en HDPE (jusqu'à 600 g) à utiliser avec un pistolet à piston.</li> </ul> Les sachets en papier thermoscellés, les barquettes et les tubes sont placés dans des <ul style="list-style-type: none"> <li>- seaux en PP avec ou sans doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- seaux en PP avec ou sans doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- sacs en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- sacs en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes métalliques (plaque d'étain électrolytique) sans revêtement intérieur contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes métalliques (plaque d'étain électrolytique) sans revêtement</li> </ul>

- intérieur contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;
- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;
  - citernes en PP, PE ou HDPE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;
  - citernes en PP, PE ou HDPE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;
  - seaux en PP avec sac intérieur en PE contenant jusqu'à 1 kg de sachets en papier (10/15 g) pour les souris : 5 à 10 kg ;
  - seaux en PP avec sac intérieur en en PE contenant jusqu'à 1 kg de sachets en papier (10/15 g) pour les rats : 5 à 10 kg ;
  - boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées inviolables en PP, chacune contenant jusqu'à 50 g de sachets en papier (10/15 g) pour les souris : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées inviolables en PP, chacune contenant jusqu'à 100 g de sachets en papier (10/15 g) pour les rats : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton contenant des barquettes en PET de 50 g avec couverture détachable pour les souris : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton contenant des barquettes en PET de 100 g avec couverture détachable pour les rats : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton contenant des stations d'appât, pré-dosées, inviolables en PP, chacune contenant une barquette en PET de 50 g, avec couverture détachable pour les souris : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées, inviolables en PP, chacune contenant une barquette en PET de 100 g, avec couverture détachable pour les rats : 5 à 15 kg ;
  - boîtes en carton ou seau en PP contenant des tubes en HDPE de 600 g pour usage avec pistolet à piston : 5 à 15 kg.

#### **4.1.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage**

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

#### **4.1.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage**

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

#### **4.1.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.



**4.1.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

-

**4.1.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

-

**4.2. Description de l'usage**

**Tableau 2. Usage # 2 – Souris et /ou rats -- Professionnels –Extérieur autour des bâtiments**

<b>Type de produit</b>	14
<b>Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé</b>	Ne s'applique pas aux rodenticides
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)</b>	<i>Mus musculus</i> (souris domestique) <i>Rattus norvegicus</i> (rat brun) <i>Rattus rattus</i> (rat noir)
<b>Domaine(s) d'utilisation</b>	Extérieur autour des bâtiments
<b>Méthode(s) d'application</b>	Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des: <ul style="list-style-type: none"> <li>- postes d'appâtage sécurisés ;</li> <li>- points d'appâtage couverts et protégés.</li> </ul>
<b>Dose(s) et fréquence(s) d'application</b>	Rats <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte infestation : Jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres</li> <li>- Faible infestation : Jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres</li> </ul> Souris : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte infestation : Jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres</li> <li>- Faible infestation : Jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres</li> </ul>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnels
<b>Taille(s) et type(s) de conditionnement</b>	Conditionnement maximum : 5 kg  Le produit BRODITOP PATE FRAICHE est conditionné dans des <ul style="list-style-type: none"> <li>- sachets en papier thermoscellés (10-15 g) ;</li> <li>- barquettes en PET (de 50 g pour les souris et de 100 g pour les rats)</li> <li>- tubes en HDPE (jusqu'à 600 g) à utiliser avec un pistolet à piston.</li> </ul> Les sachets en papier thermoscellés, les barquettes et les tubes sont placés dans des : <ul style="list-style-type: none"> <li>- seaux en PP avec ou sans doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- seaux en PP avec ou sans doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- sac en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5</li> </ul>

	<p>à 15 kg ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sacs en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes métalliques (plaque d'étain électrolytique) sans revêtement intérieur contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes métalliques (plaque d'étain électrolytique) sans revêtement intérieur contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton avec doublure interne en PE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- citernes en PP, PE ou HDPE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- citernes en PP, PE ou HDPE contenant des sachets en papier de 10/15 g pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- seaux en PP avec sac intérieur en PE contenant jusqu'à 1 kg de sachets en papier (10/15 g) pour les souris : 5 à 10 kg ;</li> <li>- seaux en PP avec sac intérieur en en PE contenant jusqu'à 1 kg de sachets en papier (10/15 g) pour les rats : 5 à 10 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées inviolables en PP, chacune contenant jusqu'à 50 g de sachets en papier (10/15 g) pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées inviolables en PP, chacune contenant jusqu'à 100 g de sachets en papier (10/15 g) pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des barquettes en PET de 50 g avec couverture détachable pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des barquettes en PET de 100 g avec couverture détachable pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des stations d'appât, pré-dosées, inviolables en PP, chacune contenant une barquette en PET de 50 g, avec couverture détachable pour les souris : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton contenant des stations d'appât pré-dosées, inviolables en PP, chacune contenant une barquette en PET de 100 g, avec couverture détachable pour les rats : 5 à 15 kg ;</li> <li>- boîtes en carton ou seau en PP contenant des tubes en HDPE de 600 g pour usage avec pistolet à piston : 5 à 15 kg.</li> </ul>
--	---

**4.2.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.</li> <li>- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.</li> <li>- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.</li> <li>- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.</li> </ul>
---

**4.2.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage**

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

**4.2.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

**4.2.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

-

**4.2.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

-

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Instructions d'utilisation

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Utiliser une spatule pour nettoyer l'équipement en évitant tout contact avec les résidus d'appât.
- Ne pas détériorer les tubes ou les barquettes contenant l'appât.

## 5.2. Mesures de gestion de risque

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.
- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.
- Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

## 5.3. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
- En cas:
  - o d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
  - o d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
  - o d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
- Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.
- Ne pas provoquer de vomissement.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette [insérer les informations nationales spécifiques]. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.
- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison [...]».
- Dangereux pour la faune.

## 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.
- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.
- Durée de conservation: 24 mois.

## 6. Autre(s) information(s)

- Il conviendra de mettre en place un programme de suivi de la résistance des populations de rongeurs à la substance active brodifacoum et de fournir les résultats de ce suivi au renouvellement de l'AMM du produit.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.